

SAPECVET

USO PROFISSIONAL

FICHA TÉCNICA

MICETEC

BLOCOS

ISCO EM BLOCOS PRONTO A USAR
com 0.005% (p/p) de bromadiolona

PARA O CONTROLO DE PRAGAS DE ROEDORES

5 Kg

Distribuído por:

Sapex Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
apoiovet@sapex.pt
www.sapexvet.pt



Av nº PT/DGS ARMPB-03/2016

UTILIZE OS BIOCIDAS COM CUIDADO. LEIA SEMPRE O RÓTULO E A INFORMAÇÃO
RELATIVA AO PRODUTO ANTES DE O UTILIZAR

COMPOSIÇÃO

Substância Ativa: 0,005% (p/p) de Bromadiolona

FORMULAÇÃO

- ISCO PRONTO A USAR
- FÁCIL DE APLICAR
- DISTRIBUIÇÃO PRÁTICA
- FORMULAÇÃO COM CEREAIS DE ALTA QUALIDADE E CERAS COMESTÍVEIS
- MOLDAGEM A QUENTE DOS BLOCOS PERMITE UMA COMPLETA UNIFORMIZAÇÃO DE TODOS OS SEUS COMPONENTES
- INCORPORAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NA FORMULAÇÃO (AGENTES AMARGANTES)
- FORMULAÇÃO COM INIBIDORES DE CRESCIMENTO DE FUNGOS E BACTÉRIAS
- RESISTENTE EM TODAS AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
- IDEAL PARA LOCAIS COM ELEVADA HUMIDADE

MODO DE AÇÃO

Atua por ingestão. Anticoagulante de 2ª geração o qual bloqueia a formação da protrombina. Uma só ingestão é suficiente para destruir ratos e ratazanas incluindo aqueles ditos “resistentes” a anticoagulantes e outros produtos.

ESPÉCIE-ALVO

Utilizado para combater: ratazana castanha (*Rattus norvegicus*), ratazana preta (*Rattus rattus*) e o rato (*Mus musculus*).

LOCAIS DE APLICAÇÃO

Colocar os iscos nos locais frequentados pelos roedores, nos seus ninhos e locais de alimentação.

Espalhar os iscos por toda a área infestada.

Para utilização dentro de casa e no exterior, apenas na área circundante dos edifícios.

Para utilização em esgotos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO DE ISCO

Colocar o isco nos locais onde existam sinais da atividade dos roedores, como dejetos frescos, dentro ou perto de ninhos e tocas, locais de passagem e de alimentação dos roedores. Colocar os pontos de iscos por toda a área infestada.

A frequência de tratamento é de 2 a 4 aplicações por ano, com 3 a 6 meses de intervalo.

O programa de controlo de pragas é repetido de acordo com a necessidade, devido à infestação, geralmente a cada 3 a 6 meses.
A duração do programa é, geralmente, até 6 semanas.

ESTRATÉGIA DE COLOCAÇÃO DE ISCO

Alvo	Intensidade da infestação	Colocação do isco	Instruções	
Ratazanas	Baixa	Até 10 blocos a cada 10 metros	Inspeccionar frequentemente os locais de colocação dos iscos nos primeiros 10-14 dias e substituir os iscos roídos, danificados pela água ou contaminados com sujidade.	Caso não aviste roedores num local de colocação de iscos durante 7-10 dias, mude os iscos para um local onde os roedores sejam avistados frequentemente.
	Alta	Até 10 blocos a cada 5 metros		
Ratos	Baixa	Até 2 blocos a cada 5 metros	Inspeccionar frequentemente os locais de colocação dos iscos nos primeiros 10-14 dias e substituir os iscos roídos, danificados pela água ou contaminados com sujidade.	Os ratos são muito curiosos. Para um melhor controlo, os iscos devem ser mudados de local após terem sido inspeccionados pelos ratos.
	Alta	Até 2 blocos a cada 2 metros		

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO

Durante o período de tratamento, procurar e remover em intervalos frequentes os roedores mortos da zona de tratamento (a não ser usados em esgotos), mas sem os deitar ao lixo ao depositar em lixeiras. Tratar os roedores mortos de acordo com as exigências das autoridades.

Depois de decorrido o período de tratamento recolher todo o produto, eliminando-o de acordo com as exigências locais.

A menos que supervisionado por um técnico de controlo de pragas ou outro técnico competente, não utilizar rodenticidas anticoagulantes como isco permanente.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Contém 1,2-benzotiazonlin-3-ona. Pode provocar reação alérgica.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de proteção.

EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO.

Antídoto específico: Vitamina K1 (sob supervisão médica).

Armazenar em recipiente fechado.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: 808 250 143