

# RATIPEC

## Cereal Dif

### FICHA TÉCNICA

Raticida para combate a ratazanas, ratos e ratinhos

USO DOMÉSTICO

Com 0,005% de **Difenacume\***  
\* O Difenacume é um anticoagulante, de acção a longo-termo.



#### Distribuído por:

**Sapac Agro, SA**

Av. do Rio Tejo- Herdade das Praias

2910-440 Setúbal

Tel. 213 222 717

apovet@sapac.pt

## **Composição**

- 0,005% (p/p) de Difenacume
- 0,001% de Benzoato de Denatónio (como agente repulsivo)

## **Formulação**

- Isco em cereal pronto a usar no combate a pragas de roedores.
- Formulação composta por trigo de alta qualidade e adjuvantes de sabor que a torna muito apelativa para os roedores.
- Muito atractiva para os roedores.
- O cereal é sujeito a um tratamento a altas temperaturas para prevenir uma possível germinação.
- Fácil aplicação.
- Para que o produto perdure durante bastante tempo são incorporados inibidores para evitar o aparecimento de fungos e bactérias.

## **Modo de acção**

- Actua por ingestão.
- Anticoagulante de 2ª geração, o qual bloqueia a formação da protrombina. Uma só ingestão é suficiente para destruir ratos e ratazanas, incluindo aqueles ditos “resistentes” a anticoagulantes e outros produtos.
- Ao fim 2-3 dias provoca hemorragias internas com morte rápida do roedor.
- Efeito de Mumificação.

## **Utilizações**

- Utilizado para combater pragas de roedores: ratazana castanha (*Rattus norvegicus*), ratazana preta (*Rattus rattus*), o rato-caseiro e ratinho (*Mus musculus*).

## **Locais de Aplicação**

- Locais onde se notar a passagem dos roedores, nos seus ninhos e locais de alimentação.
- Utilização em interiores e exteriores (apenas em torno) de edifícios de habitação, industriais, comerciais e institucionais. Não usar em esgotos.
- Os iscos devem ser colocados com uma frequência de 2 a 4 aplicações/ano, com intervalos de 3 a 6 meses.

## Modo de Emprego

- ✓ Colocar o isco em estações de isco resistentes e pontos de isco escondidos.
- ✓ Distribuir o produto em montículos nos locais onde se nota a passagem dos roedores.
- ✓ Refazer os montículos onde ocorra consumo e continuar aplicando até ter cessado o consumo.
- ✓ Os ratos são muito curiosos, para um melhor programa de controlo, mover os iscos cada 2-3 quando estes são inspeccionados ou consumidos pelos roedores.
- ✓ Se não for detectado nenhum sinal de actividade de ratazanas perto do isco após 7-10 dias, deslocar o isco para uma área com maior actividade de ratazanas.

## Estratégica de Aplicação

	Ratos e Ratinhos		Ratazanas	
Intensidade da Infestação	Baixa	Alta	Baixa	Alta
Colocação do Isco	Até <b>40g</b> a cada <b>5</b> metros	Até <b>40g</b> a cada <b>2</b> metros	Até <b>200g</b> a cada <b>10</b> metros	Até <b>200g</b> a cada <b>5</b> metros

## **Precauções de utilização**

- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças;
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais;
- Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização;
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo;
- Remover todos os iscos após o tratamento e eliminá-los de acordo com a legislação em vigor;
- Os resíduos de iscos deverão ser fechados no interior de sacos de plástico e colocados de forma segura nos contentores seguros de lixo urbano de modo a prevenir o acesso por parte da vida selvagem ou de animais domésticos, ou conduzidos para um aterro de resíduos urbanos;
- Fichas técnicas e de segurança fornecidas a pedido de utilizadores profissionais;
- Em caso de ingestão acidental procure de imediato um médico e mostre-lhe este rótulo ou consulte o Centro de Informação Anti-Venenos (808 250 143);
- Antídoto: Vitamina K.

## Embalagem



### Tipo de embalagem:

Uma embalagem de 200g de isco em cereal

Autorização de Venda nºPT/DGS ARMPB-023/2013 concedida pela DGS

### Distribuído por:

**Sapex Agro, SA**  
Av. do Rio Tejo- Herdade das Praias  
2910-440 Setúbal  
Tel. 213 222 717  
apovet@sapex.pt