

SAPECVET

USO DOMÉSTICO

FICHA TÉCNICA

SAPIX[®] RAT CEREAL

RATICIDA COM 0.005% DE BROMADIOLONA

PARA O CONTROLO DE PRAGAS DE RATOS E
RATAZANAS

200 G

Distribuído por:

Saptec Agro, S.A.
Av. do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 Setúbal
apoiovet@agro.saptec.pt



AV n.º. ARMPB – 05/2016 da DGS

SAPIX® RAT CEREAL é um raticida anticoagulante que combate pragas de roedores. A formulação é altamente atrativa para os roedores. O grão é sujeito a um tratamento a quente que impede que ocorra a germinação, conservando as suas características.

COMPOSIÇÃO

0.005% de Bromadiolona (como substância ativa)

Contém um agente amargante.

FORMULAÇÃO

Isco em grão de cereal, pronto a usar.

ORGANISMOS ALVO

Rato doméstico – *Mus musculus*

Ratazana – *Rattus norvegicus*

LOCAIS DE APLICAÇÃO

Para utilização no interior dos edifícios (por ex., em habitações) ou no exterior, apenas na área circundante.

Não usar em esgotos.

MODO DE APLICAÇÃO

Colocar o isco nos locais onde existam sinais da atividade dos roedores: dentro ou perto de ninhos e tocas, locais de passagem e de alimentação dos roedores.

Não mexer ou alterar os pontos de isco, durante alguns dias, após serem colocados.

A frequência de tratamento é de 2 a 4 aplicações por ano, com 3 a 6 meses de intervalo.

O programa de controlo de pragas é repetido de acordo com a necessidade, devido à infestação, geralmente a cada 3 a 6 meses.

ESTRATÉGIA DE COLOCAÇÃO DOS ISCOS

COLOCAÇÃO DE ISCO		
ALVO	Intensidade de infestação baixa	Intensidade de infestação alta
Rato	Até 40g a cada 5 metros	Até 40g a cada 2 metros
Ratazanas	Até 200g a cada 10 metros	Até 200g a cada 5 metros

Os iscos devem ser colocados de forma segura para minimizar o risco do consumo por outros animais ou crianças.

O produto nunca deve ser colocado indiscriminadamente.

ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO:

Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Pode provocar reação alérgica.

Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de proteção.

EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO.

Antídoto específico: Vitamina K1 (sob supervisão médica).

Armazenar em recipiente fechado.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais.

Utilize o **SAPIX® Rat Cereal** com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Em caso de acidente contactar de imediato o Centro de Informação Antivenenos (CIAV 808 250 143)